



Prémiese con ahorros:

¡Vea el reverso!

**Brilliant**  
DISTINCTIONS®  
PROGRAM

## 365 razones para pedirlo por su nombre

El *único* relleno facial de ácido  
hialurónico aprobado por la FDA que  
dura hasta 1 año con 1 tratamiento<sup>1,\*</sup>

 **Juvéderm**® Injectable gel XC

\*Esto incluye todas las formulaciones con gel inyectable JUVÉDERM®. La mayoría de los sujetos consiguió la corrección óptima en el tratamiento inicial.

**Breve descripción de las indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos adversos del gel inyectable JUVÉDERM®**

**Indicación:** En los Estados Unidos, el gel inyectable JUVÉDERM® (que incluye JUVÉDERM® Ultra, JUVÉDERM® Ultra Plus, JUVÉDERM® Ultra XC y JUVÉDERM® Ultra Plus XC) está indicado para la corrección de las líneas de expresión moderadas a profundas de la cara (tales como los dobleces nasolabiales).

Por favor lea la información importante adicional sobre la seguridad del producto en el interior de este folleto.

## **Pida el *único* relleno de ácido hialurónico aprobado por la FDA que dura hasta 1 año con 1 tratamiento<sup>1,\*</sup>**

Con el JUVÉDERM® XC de larga duración, podrá tratar esos paréntesis que aparecen a los lados de su nariz y boca por hasta 1 año con 1 tratamiento.<sup>1,\*</sup> Ningún otro relleno con ácido hialurónico (AH) puede afirmar lo mismo.

## **Pida resultados que sean personalizados, a su medida**

¿Le preocupan los tratamientos para las arrugas que se aplican a todos por igual? Con el gel inyectable JUVÉDERM® XC, su médico puede personalizar el tratamiento a su medida, y le dará los resultados instantáneos y de apariencia natural que usted busca, en sólo 1 sesión de tratamiento.

## **Pida resultados que sean suaves y naturales**

Algunos rellenos de AH tienen una consistencia granular. Sólo JUVÉDERM® cuenta con la exclusiva tecnología HYLACROSS™, que le otorga a JUVÉDERM® XC la especial consistencia de un gel suave. De esta manera, podrá obtener una apariencia y sensación suave y natural que va a durar mucho tiempo—para que todos lo noten (¡pero nadie lo sepa!).

## **Pruebe con el relleno dérmico nº 1 en los EE.UU.<sup>2</sup> Pídale por su nombre hoy mismo.**



\*Esto incluye todas las formulaciones con gel inyectable JUVÉDERM®. La mayoría de los sujetos consiguió la corrección óptima en el tratamiento inicial.

### **Breve descripción de las indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos adversos del gel inyectable JUVÉDERM® (continuado)**

**Contraindicaciones:** El gel inyectable JUVÉDERM® no se debe usar en pacientes que padecen de alergias de grave consideración caracterizadas por antecedentes de anafilaxias o antecedentes o presencia de múltiples alergias de grave consideración. JUVÉDERM® no se debe usar en pacientes con antecedentes de alergias a las proteínas bacterianas grampositivas. JUVÉDERM® Ultra XC y JUVÉDERM® Ultra Plus XC no se deben usar en pacientes con antecedentes de alergias a la lidocaína.

**Advertencias:** el gel inyectable JUVÉDERM® no se debe inyectar en los vasos sanguíneos. Si se presenta un proceso inflamatorio activo o una infección en el sitio donde se aplicó la inyección, se deberá aplazar el tratamiento hasta que el proceso subyacente se haya controlado.

**Por favor lea la información importante adicional sobre la seguridad del producto en la portada y en el interior de este folleto.**

## ANTES:

“Quería tener una apariencia lisa y suave, pero tenía que lucir natural.”



### **Breve descripción de las indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos adversos del gel inyectable JUVÉDERM® (continuado)**

**Precauciones:** No se ha establecido la seguridad del uso de JUVÉDERM® durante el embarazo, durante la lactancia, o en pacientes menores de 18 años.

No se ha establecido la seguridad y eficacia del gel inyectable JUVÉDERM® para el tratamiento en zonas que no sean las líneas de expresión y dobleces faciales

Suaviza inmediatamente esas líneas de paréntesis que aparecen a los lados de su nariz y boca



(tales como las de los labios) en estudios clínicos controlados. Los pacientes que toman sustancias que pueden prolongar el sangrado, tales como aspirina o ibuprofeno, podrán experimentar un incremento en el sangrado o la presencia de moretones en el sitio de la inyección, como sucede con cualquier inyección. Los pacientes deberán informarle a su médico antes del tratamiento si están utilizando este tipo de sustancias. Como es el caso para todos los procedimientos donde se aplica una inyección en la piel, existe el riesgo de infección. JUVÉDERM® se debe usar con precaución en aquellos pacientes que están bajo tratamiento con inmunosupresores, o bajo un tratamiento que disminuye la respuesta inmune del cuerpo, ya que puede existir un mayor riesgo de infección.

## DESPUÉS:

“¿Satisfecha? Estoy más que satisfecha—  
¿por qué no hice esto antes?”

-Marinda




### **Los resultados individuales pueden variar.**

Resultados verdaderos de usuarios contratados. Las fotos de los modelos se tomaron 4 semanas después del tratamiento.

No se ha estudiado la seguridad de JUVÉDERM® en pacientes con antecedentes de cicatrización excesiva (por ejemplo, cicatrización hipertrófica y formación de queloides) y con trastornos de la pigmentación. Si tiene pensado tomar un tratamiento con láser, un peeling químico o cualquier otro procedimiento que se base en una respuesta activa de la dermis después de la aplicación del gel inyectable JUVÉDERM®, o si se aplica JUVÉDERM® antes de que la piel se haya recuperado completamente después de haberse realizado alguno de estos procedimientos, existe el riesgo posible de una reacción inflamatoria en el sitio del tratamiento.

Por favor lea la información importante adicional sobre la seguridad del producto en la contraportada de este folleto.



Dobles  
nasolabiales  
o paréntesis\*

Líneas labiales  
verticales\*

Comisuras orales\*

Líneas de  
marioneta\*

Arrugas en la barbilla\*

## Pida por una **SUAVE COMODIDAD**<sup>3,†</sup> Y RESULTADOS INMEDIATOS

El gel inyectable JUVÉDERM® XC se aplica en el consultorio del médico en poco tiempo y requiere un tiempo mínimo de inactividad. Durante el tratamiento, el proveedor médico le colocará JUVÉDERM® XC debajo de la piel para suavizar sus líneas de expresión moderadas a profundas. ¡Podrá ver la diferencia inmediatamente!

Los efectos secundarios son usualmente leves a moderados, y duran 7 días o menos.



Injectable gel  
**Juvéderm® XC**

\*En los Estados Unidos, el gel inyectable JUVÉDERM® XC está indicado para la corrección de las líneas de expresión de la cara moderadas a profundas (tales como los dobleces nasolabiales).

† JUVÉDERM® XC proporciona una mayor comodidad en comparación con las formulaciones de JUVÉDERM® sin lidocaína.

## Pida resultados<sup>1</sup> DURADEROS que pueda ver—inmediatamente

El gel inyectable JUVÉDERM® XC suaviza inmediatamente las líneas de expresión (paréntesis) que aparecen a los lados de la nariz y la boca.



3 jeringas  
JUVÉDERM® Ultra XC (2.4 mL)

JUVÉDERM® XC dura hasta 1 año después de 1 solo tratamiento.<sup>1,\*</sup>



3 jeringas  
JUVÉDERM® Ultra Plus XC (2.4 mL)

El tratamiento con el gel inyectable JUVÉDERM® XC se puede personalizar para garantizar una apariencia suave y natural.



1 jeringas  
JUVÉDERM® Ultra Plus XC (0.8 mL)

**Los resultados individuales pueden variar.**

Resultados verdaderos de usuarios contratados. Las fotos de los modelos se tomaron 4 semanas después del tratamiento.

\*Esto incluye todas las formulaciones con gel inyectable JUVÉDERM®. La mayoría de los sujetos consiguió la corrección óptima en el tratamiento inicial.

Por favor lea la información importante adicional sobre la seguridad del producto en la portada, en el interior y en la contraportada de este folleto.

Prémiese con ahorros por  
su lealtad. Todas las veces.

Brilliant  
DISTINCTIONS®  
PROGRAM

Inscríbese en el programa y  
comience a ahorrar hoy mismo:  
[JuvedermXC.com](http://JuvedermXC.com)

**Breve descripción de las indicaciones de uso,  
contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos  
adversos del gel inyectable JUVÉDERM® (continuado)**

**Efectos adversos:** Los efectos secundarios más comunes que se han reportado son enrojecimiento, hinchazón, dolor/sensibilidad, firmeza, bultos/chichones y moretones temporarios en la zona de la inyección. La mayoría de los efectos secundarios son de naturaleza leve o moderada, y de breve duración (7 días o menos).

**Importante:** Para obtener la información completa sobre la seguridad del producto, puede visitar [www.juvederm.com](http://www.juvederm.com) o llamar al Soporte del Producto de Allergan al 1-877-345-5372.

**PRECAUCIÓN:** Sólo con receta médica.



1. Pinsky MA, Thomas JA, Murphy DK, Walker PS; para el grupo de estudio del pliegue nasolabial de JUVÉDERM® vs ZYPLAST®. Gel inyectable JUVÉDERM®: Un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado sobre la seguridad y eficacia. *Aesthetic Surg J.* 2008;28(1):17-23.
2. Datos en archivo, Allergan, Inc., junio de 2011; Informe sobre participación de mercado de los inyectables faciales en los EE.UU.; Rastreador de Guidepoint Global Share, enero de 2009 a mayo de 2011.
3. Weinkle SH, Bank DE, Boyd CM, Gold MH, Thomas JA, Murphy DK. Un estudio controlado multicéntrico, doble ciego, aleatorizado sobre la seguridad y eficacia del gel inyectable JUVÉDERM® con y sin lidocaína. *J Cosmet Dermatol.* 2009;8(3):205-210.



**ALLERGAN**

THE SCIENCE OF REJUVENATION™

©2011 Allergan, Inc. Las marcas ® y ™ son propiedad de Allergan, Inc.

La marca JUVÉDERM® es propiedad de Allergan Industrie, SAS.

[www.juvederm.com](http://www.juvederm.com) Reabastecimiento: APC53ND11 112852